

FUTURO

Preuniversitario

Matemática B

Ángulos en el plano y Triángulos

Departamento de Matemática

Preuniversitario Futuro



Aprendizaje Esperado

Conocer e identificar los conceptos básicos y los elementos primarios del triángulo.



CONCEPTOS BÁSICOS


1) Punto: Es un Concepto primitivo, es el elemento más simple de la geometría. Intuitivamente se le imagina como una mancha muy pequeña.

Se le suele denotar con las letras mayúsculas, tales como A, B, C, etc.



2) Recta: Es la línea generada por un punto que se mueve sin cambiar de dirección. Intuitivamente, es similar a un hilo delgado y tenso que se extiende ilimitadamente en ambos sentidos

Se designa con una letra mayúscula o por dos letras mayúsculas y coronadas por una flecha en ambos sentidos.





CONCEPTOS BÁSICOS

3) Plano: Es el conjunto infinito de puntos.


Nuevamente, nuestra experiencia nos apoya. La superficie de una mesa, la superficie de un pizarrón, son soportes para abstraer e imaginar un plano.

Tal como en la recta, el plano no tiene límites en sus dos dimensiones.

4) Puntos Coplanares: Son aquellos que pertenecen a un mismo plano.



Plano P






CONCEPTOS BÁSICOS


5) Puntos Colineales: Son aquellos que pertenecen a una misma recta.

Los Puntos A, B y C son colineales.




6) Trazo: Dados dos puntos A y B en una recta, se le llama trazo o segmento a los puntos A y B y a todos los puntos de la recta que están entre A y B.

Los puntos A y B se denominan puntos extremos del trazo AB, se denota por AB.



7) Trazos Congruentes: Dos trazos son congruentes si tienen la misma medida.





CONCEPTOS BÁSICOS


8) Rayo: Dados dos puntos A y B en una recta, se llama rayo AB al punto A y a todos los puntos de la recta al mismo lado en que está B respecto de A.

También diremos que el punto A es extremo del rayo $\overrightarrow{AB}$, se denota AB.



9) Ángulo: Figura geométrica compuesta por dos rayos distintos que salen de un punto en común, los rayos se denominan lados del ángulo y su origen vértice del mismo.

En la figura, el ángulo está formado por la unión de los rayos $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$, cuyo origen común es el punto O, que es el vértice del ángulo. Lo denotamos $\angle AOB$, o simplemente $\angle O$.





SISTEMAS DE MEDIDA

1) Sistema Sexagesimal: En este sistema se considera que la circunferencia está dividida en 360 partes sexagesimales.

Además, cada grado sexagesimal se divide en 60 partes congruentes llamados minutos sexagesimales y cada minuto se divide a su vez en 60 partes congruentes llamados segundos sexagesimales.

1 Circunferencia	=	360 grados
1 grado	=	60 minutos
1 minuto	=	60 segundos

$$1 = 360^{\circ}$$


$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$



SISTEMAS DE MEDIDA

2) Sistema Circular: En el sistema circular, la unidad de medida es el radián (rad), que es el ángulo del centro de una circunferencia correspondiente a un arco cuya longitud tiene igual medida que la longitud del radio de la circunferencia.




$$\overline{OA} \cong \overline{OB} \cong \text{arco } AB$$

$$\angle AOB = 1 \text{ rad}$$




CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS


1) **Ángulo Agudo:** Es un ángulo cuya medida es mayor a 0° y menor a 90° .




2) **Ángulo Recto:** Es un ángulo cuya medida es 90° .




3) **Ángulo Obtuso:** Es ángulo cuya medida es mayor a 90° y menor a 180° .



4) **Ángulo Extendido:** Es un ángulo cuya medida es 180° .




5) **Ángulo Completo:** Es un ángulo cuya medida es 360° .






RELACIÓN ENTRE DOS ÁNGULOS EN EL PLANO

1) Ángulos Contiguos: Son aquellos que tienen el vértice y un lado en común. $\angle AOB$ contiguo al $\angle BOC$.



2) Ángulos Complementarios: Dos ángulos cuya suma de sus medidas es 90° se dicen complementarios.




α y β complementarios si $\alpha + \beta = 90^\circ$

Complemento de un Ángulo: Es el ángulo que sumado con él complementa 90° . Si α es un ángulo agudo, su complemento se representa por:

$$90^\circ - \alpha$$



RELACIÓN ENTRE DOS ÁNGULOS EN EL PLANO



3) Ángulos Suplementarios: Dos ángulos cuya suma de sus medidas es 180° se dicen suplementarios.


α y β suplementarios si $\alpha + \beta = 180^\circ$

Suplemento de un Ángulo: Es el ángulo que sumado con él completa 180° . Si α es un ángulo agudo u obtuso, su suplemento se representa por:

$$180^\circ - \alpha$$




RELACIÓN ENTRE DOS ÁNGULOS EN EL PLANO



α y β son opuestos por el vértice

6) Ángulos Opuestos por el vértice: Dos ángulos son opuestos por el vértice, si los lados de uno son la prolongación de los lados del otro, los cuales o siempre tienen la misma medida.




7) Bisectriz de un ángulo: Es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes.

En la figura OC es bisectriz, entonces

$$\angle AOC \cong \angle COB$$




RELACIÓN ENTRE DOS RECTAS EN EL PLANO



L_1 y L_2 son coplanares


1) Rectas Coplanares:

Son aquellas que pertenecen a un mismo plano.



2) Rectas Secantes:

Dos rectas coplanares con sólo un punto en común se denominan secantes.




L_1 perpendicular a L_2 : $L_1 \perp L_2$

3) Rectas perpendiculares:

Dos rectas son perpendiculares si al cortarse forman cuatro ángulos rectos.




RELACIÓN ENTRE DOS RECTAS EN EL PLANO



L_1 paralela a L_2 : $L_1 \parallel L_2$

4) Rectas paralelas:

Son aquellas rectas que estando en el mismo plano, no tienen puntos en común.




5) Simetral:

Dado un trazo $\overline{AB}$, se llama simetral a la perpendicular a AB que contiene al punto medio de dicho trazo.



ÁNGULOS ENTRE RECTAS PARALELAS CORTADAS POR UNA SECANTE O TRANSVERSAL

Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante se forman 8 ángulos, de los cuales algunos son congruentes y otros suplementarios



Opuestos por el vértice:

$$\alpha \cong \gamma \quad ; \quad \beta \cong \delta$$
$$\alpha' \cong \gamma' \quad ; \quad \beta' \cong \delta'$$

Alternos Internos:

$$\delta \cong \beta' \quad ; \quad \gamma \cong \alpha'$$

Correspondientes:

$$\alpha \cong \alpha' \quad ; \quad \delta \cong \delta'$$
$$\gamma \cong \gamma' \quad ; \quad \beta \cong \beta'$$

Alternos Externos:

$$\alpha \cong \gamma' \quad ; \quad \beta \cong \delta'$$



TRIÁNGULOS


1) Definición:

Un triángulo ABC es la unión de tres rectas que se cortan de dos en dos.

2) Elementos Primarios en un triángulo:

Los puntos de intersección se denominan **vértices** del triángulo.

Los segmentos son los **lados** del triángulo. Se determinan **tres ángulos interiores** cuyos lados son los tres lados del triángulo tomados de dos en dos



Vértices: A, B y C

Lados: a, b, c.

Ángulos Interiores: $\angle CAB = \alpha$,
 $\angle ABC = \beta$, $\angle BCA = \gamma$.

Ángulos Exteriores: α' , β' y γ' .



Teoremas

TRIÁNGULOS

- 1) En todo triángulo “la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180° ”

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

- 2) En todo Triángulo “la suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360° ”


$$\alpha' + \beta' + \gamma' = 360^\circ$$

- 3) “El ángulo exterior de un triángulo tiene por medida la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él”

$$\alpha' = \beta + \gamma$$

$$\beta' = \alpha + \gamma$$

$$\gamma' = \alpha + \beta$$






TRIÁNGULOS

Teoremas


- 4) “Si un triángulo tiene dos lados congruentes, entonces tiene dos ángulos congruentes”

$$\text{Si } AC \cong BC \Rightarrow \angle CAB \cong \angle ABC$$



- 5) “En un triángulo el lado de mayor medida se opone al ángulo de mayor medida”

$$\text{Si } AC > BC \Rightarrow \angle CBA > \angle BAC$$




- 6) “En todo triángulo la medida de uno de sus lados es mayor que la diferencia y menor que la suma de las medidas de los otros dos lados”

$$|c - b| < a < c + b$$

$$|c - a| < b < c + a$$

$$|a - b| < c < a + b$$








TRIÁNGULOS

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS

1) Según sus lados:

- a) **Triángulo Isósceles:** Dos lados congruentes y el tercer lado de distinta medida (llamado base). Por tanto, dos de sus ángulos interiores tienen igual medida (llamados ángulos basales)
- b) **Triángulo Equilátero:** Tres lados congruentes, tres ángulos interiores congruentes (60° cada uno)
- c) **Triángulo Escaleno:** Tres lados y tres ángulos interiores tienen distinta medida






TRIÁNGULOS

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS


2) Según sus ángulos

a) **Triángulo Acutángulo:** Sus tres ángulos interiores agudos.




Δ Acutángulo

b) **Triángulos Rectángulo:** Un ángulo recto.



Δ Rectángulo

c) **Triángulos Obtusángulo:** Un ángulo interior obtuso.



Δ Obtusángulo




TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables

a) **Altura:** Es la recta que nace de un vértice e intersecta al lado opuesto o a su prolongación formando con éste un ángulo recto.

Observación: Las tres alturas de un triángulo se intersectan en un mismo punto, llamado **Ortocentro**, este punto puede quedar dentro, fuera o en el triángulo mismo.






TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables

b) Bisectriz: Es el rayo que sale de un vértice del triángulo y divide al ángulo interior en dos.

Observación: Las tres bisectrices se intersectan en un mismo punto llamado **Incentro**, el cual corresponde al centro de una circunferencia inscrita en el triángulo.



b_c es bisectriz del $\angle ACB \Rightarrow \angle ACD \cong \angle DCB$

b_a es bisectriz del $\angle BAC \Rightarrow \angle BAE \cong \angle EAC$

b_b es bisectriz del $\angle ABC \Rightarrow \angle FBA \cong \angle CBF$




TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables

c) **Simetral o Mediatriz:** Es la recta perpendicular al lado del triángulo, levantada desde el punto medio del lado. Las simetrales, por lo general, no pasan por el vértice del triángulo.

Observación: Las tres simetrales se intersectan en un mismo punto llamado **Circunscentro**, el cual corresponde al centro de una circunferencia circunscrita al triángulo.



S_a : Simetral

S_b : Simetral

S_c : Simetral

TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables


d) **Transversal de Gravedad:** Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

t_a , t_b y t_c son transversales de gravedad, entonces $BE \cong EC$; $AF \cong FC$; $AD \cong DB$

D, E y F puntos medios de AB, BC y AC respectivamente

$$\frac{AG}{GE} = \frac{BG}{GF} = \frac{CG}{GD} = 2$$

$$AG = 2GE; BG = 2GF; CG = 2GD$$



TRIÁNGULOS



ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables

✓ Las transversales de dividen a un triángulo cualquiera en seis triángulos equivalentes (igual área).

✓ En particular, en un triángulo rectángulo, la transversal que pertenece al vértice del ángulo recto es congruente a los segmentos que divide.

Observación: Las tres transversales de gravedad se intersectan en el mismo punto llamado **Centro de Gravedad o Baricentro**.



$$\overline{AD} \cong \overline{DB} \cong \overline{CD}$$



TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

1) Rectas Notables

e) Medianas: Son los segmentos de rectas que se obtienen al unir los puntos medios de los lados del triángulo.

a) M, N y O puntos medios de sus lados respectivos

b) MN, MO y NO son las medianas del triángulo


c) $MN \parallel AB$; $ON \parallel AC$; $OM \parallel BC$

d) $OM \cong BN \cong NC$; $ON \cong AM \cong MC$;

$MN \cong AO \cong OB$

e) Cuatro triángulos que se forman al trazar las tres medianas son congruentes (igual forma y tamaño)

$\triangle ABC$: $\triangle I \cong \triangle II \cong \triangle III \cong \triangle IV$






TRIÁNGULOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS


2) Puntos Notables del Triángulo

a) **Ortocentro(H):** Punto de intersección de las tres alturas de un triángulo cualquiera.



b) **Incentro(I):** Punto de intersección de las tres bisectrices de un triángulo cualquiera.

- ✓ El incentro es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo.
- ✓ El incentro está siempre en el interior del triángulo.
- ✓ El incentro equidista de los tres lados del triángulo.





TRIÁNGULOS


ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LOS TRIÁNGULOS

2) Puntos Notables del Triángulo

c) Circuncentro(C): Punto de intersección de las tres simetrales de un triángulo cualquiera


✓ El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo.

✓ El circuncentro equidista de los tres vértices del triángulo



d) Centro de Gravedad o Baricentro(G):

Punto de intersección de las transversales de gravedad de un triángulo cualquiera.



TRIÁNGULOS

PROPIEDADES PARTICULARES TRIÁNGULO EQUILÁTERO

a) $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC} = a$

b) Ángulos interiores igual a 60°

c) Alturas: $\overline{CM} \cong \overline{AN} \cong \overline{BO}$

d) Las rectas trazadas desde cada vértice son una misma recta notable:


$$\overline{AN} = t_a = h_a = S_a = b_a;$$

$$\overline{BO} = t_b = h_b = S_b = b_b;$$

$$\overline{CM} = t_c = h_c = S_c = b_c$$

e) M, N y O son puntos medios de AB, BC y CA respectivamente;

$$\overline{AM} \cong \overline{MB}; \overline{BN} \cong \overline{NC} \text{ y } \overline{AO} \cong \overline{OC}.$$



TRIÁNGULOS

PROPIEDADES PARTICULARES TRIÁNGULO ISÓSCELES

a) $\overline{BC} = \overline{AC} = a$ lados iguales; $\overline{AB} = c$ lado distinto

b) γ : Ángulo distinto perteneciente al vértice C

c) Las rectas notables trazadas desde el vértice C son una misma recta:

$$\overline{CM} = \overline{tc} = \overline{hc} = \overline{Sc} = \overline{bc}$$

d) Las rectas notables que nacen desde los vértices A y B, son congruentes entre si:

$$\overline{ba} \cong \overline{bb};$$

$$\overline{ta} \cong \overline{tb};$$

$$\overline{Sa} \cong \overline{Sb};$$

$$\overline{AN} = \overline{BO} = \overline{ha} = \overline{hb}$$

e) M punto medio de $\overline{AB}$, $\overline{AM} \cong \overline{MB}$;

